

# Víboras

## Víboras de Cascabel

Las víboras de cascabel tienen cabezas triangulares más anchas que su cuello. Su marca característica es un cascabel al final de su cola, el cual sirve frecuentemente como una señal de aviso cuando éstas se sienten amenazadas. Tienen un amplio rango de variación de color.



Utilizan áreas en las fosas de la cabeza con sensibilidad al calor. El veneno se inyecta por colmillos que penetran la piel de la víctima.

## Cabeza de Cobre

Las víboras cabeza de cobre también son vipéridos (víboras de fosas) y se reconocen por su cuerpo y cabeza de color cobre. El cuerpo está marcado con rayas de un color café más oscuro en un diseño como reloj de arena. Igual que sus familiares la víbora de cascabel y el mocasín acuático, la cabeza de cobre es una víbora potencialmente peligrosa.




## Mocasín Acuático Boca de Algodón

La boca de algodón es la única víbora acuática norteamericana que es venenosa. Esta peligrosa víbora semi-acuática es agresiva, no cede su terreno, y hasta se acerca a un(a) invasor(a). Se caracteriza por un cuerpo de color café, verde oliva o negruzco con abdomen más claro y anillos con bordes distintos. La boca frecuentemente



está abierta en una posición inquietante, exponiendo la blanca superficie interna de la cual deriva su nombre. Es un depredador peligroso y puede ocasionar una mordedura dañina.



## Víboras de Coral (Coralillo)

Esta víbora es típicamente muy pequeña, con un tamaño promedio de solamente 20 pulgadas. La belleza de esta víbora representa un verdadero peligro, ya que los niños pequeños podrían querer agarrarla. La víbora de coral que se encuentra en Texas es la única víbora con anillos completos de color negro, rojo y amarillo, y cuyos anillos rojos tocan los amarillos. "El rojo junto al amarillo mata al chiquillo. El rojo junto al negro no trae veneno." Aunque los colmillos son relativamente pequeños, pueden introducir un veneno destructivo.



## Prevención y Tratamiento

### Para insectos o arañas:

- Quite las telarañas y los nidos
- Extraiga el aguijón si es posible
- Lave con jabón y agua
- Si la víctima desarrolla comezón o irritación, llame al Centro para el Control de Envenenamientos para instrucciones.
- Si el paciente desarrolla problemas respiratorios, resuello, o hinchazón alrededor de los labios o la lengua, llame al 911.


### Para víboras:

- Evite áreas donde habitan las víboras
- No utilice hielo ni un torniquete.
- Llame al Centro para el Control de Envenenamientos para instrucciones
- Vaya a la sala de emergencias más cercana

Fotos utilizadas con permiso  
Carolyn Insall, *Central Texas Poison Center*  
Hormiga - *Texas A&M University*, College Station, TX  
Víbora de coral - *Cameron Park Zoo*, Waco, TX

# Mordeduras y Picaduras

## GUÍA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO



TEXAS POISON  
CENTER NETWORK  
[Red de los Centros para el  
Control de Envenenamientos  
de Texas]

POISON  
Help  
1-800-222-1222

# Mordeduras y Picaduras

## Hormigas Rojas

Hay dos especies de hormigas rojas. Ellas responden rápida y agresivamente a cualquier alboroto de su colonia o fuente de alimentos. Una sola hormiga roja puede picar repetidamente y así picará, aún después de que el saco de veneno esté vacío. Inicialmente, las picaduras resultan en una sensación localizada de quemazón intensa, seguido en las 24 a 48 horas después por la formación de una pústula blanca en el sitio de la picadura. Una minoría de las personas que sufren las picaduras son hipersensibles al veneno y necesitan un tratamiento más intenso.



## Alacranes (Escorpiones)



En Texas, hay aproximadamente 18 especies de alacranes con un promedio de 2 a 3 pulgadas de tamaño. Ellos pueden ocasionar una picadura dolorosa como la de una abeja, y ésta quizá

produzca una reacción local. Aunque los alacranes de Texas no se consideran ser mortales, el veneno es una neurotoxina y cualquier persona que sufra una picadura debe ser vigilada atentamente para reacciones adversas o alérgicas.

## Abejas y Avispas

Las abejas típicamente establecen nuevos enjambres en la primavera y el otoño. Éstas son las temporadas en que ellas son más activas. Puede picarle solamente una



vez cualquier tipo de abeja. Si es posible, extraiga el aguijón raspándolo de la piel. No apriete el aguijón para quitarlo. Consulte al Centro para el Control de Envenenamientos si los síntomas incluyen la dificultad respiratoria, la urticaria, los calambres, una opresión en el pecho u otro tipo de reacción alérgica, o llame al 911.

Las avispas también producen una picadura dolorosa y pueden picarle a usted varias veces. Ellas no pierden su aguijón. Trate las reacciones locales de la misma manera que trata otras mordeduras y picaduras.

## Tarántulas



Las tarántulas no son arañas agresivas y solamente pican al estar acorraladas o al sentirse amenazadas. Éstas sí tienen veneno. No hay evidencia científica de que alguno de sus venenos sea mortal; sin

embargo, las picaduras de algunas especies pueden ser dolorosas y causar síntomas desagradables. La mayoría de las picaduras son como las picaduras de abeja. Si usted sufre una picadura y tiene dificultad en respirar, es posible que sea alérgico(a) y debería llamar al 911.

## Ciempis

Los ciempis tienen un par de patas por cada segmento de su cuerpo. El tamaño promedio es de 2 a 10 pulgadas.

Típicamente se encuentran afuera, en un hábitat oscuro y húmedo. Tienen un par de pinzas venenosas debajo de la cabeza. Su picadura es dolorosa y podría causar hinchazón, pero por lo general estos efectos disminuyen rápidamente.



## Araña Reclusa

La araña reclusa se conoce comúnmente como "la violinista" a base de la marca en forma de violín en el dorso de la cabeza. La forma e intensidad del diseño de violín pueden variar. El tamaño del cuerpo es de 1/4 a 3/4 de una pulgada, y las patas pueden extenderse aproximadamente al tamaño de una moneda de cincuenta centavos. Vive en lugares oscuros y aislados donde hay poca actividad. Los efectos de una picadura podrían ser inmediatos o atrasados, y varían de una sensación de ardor a un dolor intenso. Dentro de 24 a 36 horas, podrían aparecer fiebre, escalofríos, debilidad y dolor. Dentro de 24 horas, el sitio de la picadura puede convertirse en una lesión ulcerosa. Debido a un potencial de problemas médicos, llame al Centro para el Control de Envenenamientos para instrucciones.



## Araña Viuda Negra



La araña viuda negra es la más reconocida de las arañas venenosas. Son tímidas y prefieren vivir afuera en cavidades protegidas. La hembra mide aproximadamente 1.5 pulgadas de largo y tiene

una marca roja en forma de un reloj de arena en la parte inferior de su abdomen esférico. El varón mide aproximadamente la mitad del tamaño de la hembra, igual que las arañas inmaduras, podría ser de color café, con marcas anaranjadas, rojas o blancas en la espalda y los lados del abdomen. Las hembras pican al sentirse amenazadas o al proteger un saco de huevos. La picadura no es dolorosa por lo general y es posible que ni se sienta. La neurotoxina causa un dolor intenso dentro de 1 a 3 horas y puede causar dificultades respiratorias. Las picaduras podrían ser problemáticas, en particular para los bebés y las personas mayores de edad. Llame al Centro para el Control de Envenenamientos para instrucciones si sufre una picadura.